DOI:10.15933/j.cnki.1004-3268.2004.07.029

怎样提高羔羊成活率

张 玲
(信阳农业高等专科学校动物科学系,河南 信阳 464000)

中图分类号:S826 文献标识码:B 文章编号:1004-3268(2004)07-0087-01

随着农村经济结构的调整优化,养羊业得到了迅速发展。但农村受饲养、防病技术条件的限制,羔羊成活率较低,尤其是冬羔和良种羔,限制了养羊业的发展。现将提高羔羊成活率的技术措施介绍如下。

1 安排好母羊的配种时间和产羔计划

母羊怀孕期为 5 个月,产后需一定时间进行生理性恢复。要根据不同地区、不同养羊场的年产胎次和产羔时间确定配种时间。年产 1 胎的母羊,有冬季产羔和春季产羔两种。冬季产羔时间在 1~2 月份,需要 8~9 月份配种;春季产羔时间在 4~5 月份,需要 11~12 月份配种。2 年产 3 羔的母羊,第 1 年 5 月配种,10 月份产羔;第 2 年 1 月份配种,6 月份产羔;9 月份配种,翌年 2 月份产羔。管理粗放、羊舍条件差的养羊户,安排产羔时间最好避开严寒季节。

2 加强母羊妊娠后期管理

妊娠后期胎儿生长迅速,需要丰富的全价营养,增重约占初生体重的 80%。特别是肉用羊妊娠后期的管理水平关系到胎儿的发育、羔羊初生重和出生后生长速度的提高。如果妊娠后期正值枯草期,母羊营养不足、体重下降,导致胎儿发育不良,羔羊初生体重小,体温调节机能差,抵抗力弱,成活率低。因此,妊娠后期母羊的饲料营养要平衡,量要充足,热代谢水平要提高到 15%~20%,磷和钙的需要量应增加饲料供给 40%~50%,还需要足量的 V_A 和 V_D,而钙磷比例以 2∶1 为宜。

母羊妊娠后期要注意适量运动,以减少难产。以放牧为主的羊,冬季每天要放牧 6 h,行程不少于 8 km;放牧中要稳走慢赶,以防拥挤跌倒。临产前 7~8 d,要就近放牧,防止分娩时来不及回羊舍。

3 把好接产关

一是记准配种时间,推定预产期。二是辨清分娩征象,做好接产准备。母羊临产时,骨盆韧带松弛,腹部下垂,尾根两侧下陷,乳房胀大,乳头下垂;阴门肿胀潮红,有时流出浓稠黏液,排尿次数增多;食欲减退,起卧不安,不时回顾腹部或喜独卧静处。当发现羊卧地,四肢伸直、努责,兼窝下陷时,即为分娩迹象,此时应将分娩母羊移入提前消过毒的产舍,产舍要有取暖升温设备(冬季)。

母羊产羔时最好让其自行产出。正常情况下,经产母羊产羔较快,羊膜破裂后数分钟至 0.5 h 左右即可顺产。产双羔时先后间隔 5~30 min,偶有长达 10 h 以上的。

羔羊产出后,首先要掏出和擦干口、鼻、耳内的黏液,以免引起窒息或异物性肺炎。羔羊身上的黏液要让母羊舔净,有助于母羊认羔;如果母羊恋羔性弱,可把羔羊身上的黏液涂到母羊嘴上,引诱母羊舔干;如果母羊仍不舔或天气较冷时,应尽快用干草擦净羔羊,以免受凉感冒。同时还要用 5%碘酊消毒脐带。

4 搞好初产母羊和羔羊的护理

产后母羊体液和体能消耗较多,新陈代谢降低,抵抗力减弱,应注意保暖、静养、防潮、防贼风、防感冒。可用益母草 200 g 煎水去渣加红糖 100 g 让其自由温服(忌冷),以促进子宫和体能的恢复;喂易消化的饲料,少食多餐,预防消化不良。

初生羔羊体质较弱,适应力和抵抗力差,易染病,要注意保温以及羊舍的清洁与消毒。羔羊出生后 10min 即能站立,应人工帮助羔羊尽快吃到初乳,初乳中富含营养物质和抗体,有抗病作用。

哺乳期羔羊发育快,缺乳将影响羔羊发育且易染病,对缺乳羔羊应找保姆羊(死掉羔的或有余奶的母羊)代哺。人工哺乳易引起羔羊腹泻,要注意配乳的浓度,做好消毒,并注意定时、定量、定温饲喂,要少食多餐。

5 把好断奶关

羔羊 3~4 月龄即可断奶,此时羔羊由吃乳转为食料,消化系统不能很快适应,是羔羊发育的危险期。应加强护理,防止羔羊体重下降。放牧时需补饲适量的干草和精料,并实行分群管理。

收稿日期:2004-01-05
作者简介:张 玲(1957-),女,河南正阳人,副教授,本科,主要从事畜牧教学和研究工作。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net